

登録番号	農薬の種類	農薬の名称	申請者の名称	用途	適用作物	適用病害虫・雑草	希釈倍率 使用量	使用時期	使用回数	使用方法
23384	テブチウロン・DBN・D CMU粒剤	ロニーV粒剤	保土谷アグ ロテック	除草剤	樹木など	一年生雑草、一年生及び多年生広 葉雑草、スギナ	10aあたり10～ 30kg	雑草発生前、雑 草生育初期(草 丈20cm以下)	3回以内	植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に全面 土壌散布
23385		草退治V粒剤	住友化学 園芸							
23386	エチプロール・メミノス トロピン剤	ワイドパンチ豆つぶ	クミアイ化 学	殺虫殺 菌剤	稲	いもち病、紋枯病、ウンカ類、カメム シ類	10aあたり250g	収穫35日前まで	1回	湛水散布
23387	テブコナゾール・フルオ ピラム水和剤	オルフィンプラスフロ アブル	バイエル	殺菌剤	なし、すもも、お うとう、ぶどう	黒星病、黒斑病、灰星病、灰色かび 病	3000倍 10aあたり200～ 700リットル	収穫前日まで	3回以内	散布
23388	ミヤコカブリダニ剤	ミヤコスター	住化テクノ	殺虫剤	野菜類(施設栽 培)	ハダニ類	10aあたり2000頭	発生初期	—	放飼
23389	アセフェート水和剤	打ち込み上手	住化グリー ン	殺虫剤	さくら	モンクロシャチホコ、アメリカシロヒト リ	2倍 1孔当り1mL	発生初期	2回以内	樹幹注入
23390	ビートアーミルア剤	ヨトウコン-S	信越化学	その他	シロイチモジヨト ウが加害する作 物	シロイチモジヨトウ	10aあたり100～ 700本(露地とハ ウスで異なる)	シロイチモジヨト ウの発生初期～ 終期	—	支柱等に 固定
23391	CYAP粉剤	協友サイアノックス 粉剤	協友アグリ	殺虫剤	かぶ、キャベ ツ、はくさい、だ いこん、きゅう り、だいず	アオムシ、アブラムシ類、コナガ、ヨト ウムシ若齢幼虫、マメシクイガ、ウ コンノメイガ	10aあたり3～5kg	収穫14日前まで ～収穫開始3日 前まで(作物に よって異なる)	2回以内	散布